

SUPER STOP BROT® 18

Solução concentrada (SL) com 18% (p/v) de Hidrazida Maleica

Regulador de crescimento de plantas para o controlo do espigamento em alho

O SUPER STOP BROT 18 é um produto com acção sistémica à base de Hidrazida Maleica, para aplicação por pulverização sobre as plantas, durante o seu desenvolvimento vegetativo.

O produto é absorvido pelas folhas, nas 24 horas após a aplicação, sendo translocado até aos bolbos, num período de tempo de cerca de 15 dias. A Hidrazida Maleica inibe a divisão das células na região meristemática, afectando negativamente o crescimento dos grelos do alho, não permitindo que cresçam, quer no campo quer no armazém.



Para aplicação por pulverização, sobre a cultura instalada no campo

Evita o espigamento do alho armazenado com uma só aplicação no campo

Alho sem tratamento



Alho tratada com SUPER STOP BROT 18


- Inibe o espigamento do alho armazenado.
- Evita o espigamento no campo.
- Melhor qualidade e produtividade.
- Facilita a gestão do armazenamento e comercialização.
- Fácil aplicação no campo, por pulverização.

Época de Aplicação

A fase de desenvolvimento da planta no momento da aplicação do SUPER STOP BROTO® 18 é determinante para se obter a máxima eficiência.

Para que ocorra a completa absorção e translocação do produto desde a parte aérea até aos bolbos, a aplicação deve ser efectuada quando os bolbos já estão formados, em plena maturação, mas a parte aérea ainda está verde.

- Em plena maturação dos bolbos.
- Desde os 10% de plantas com o caule tombado, até 10-15 dias antes da colheita.



Dose e Concentração de Aplicação

Dose de Aplicação:	13,3 L/ha
Volume de Calda:	500 a 600 L/ha
Concentração:	2,2 a 2,66 l/hl
Número Máximo de Aplicações:	1 aplicação
Intervalo de Segurança:	15 dias

- Adaptar os volumes de calda ao desenvolvimento da cultura e á superfície foliar a pulverizar.
- Pulverização uniforme, com gota fina, de forma a que o produto fique bem repartido por toda a superfície foliar.
- As plantas devem ficar bem molhadas, sem haver escorrimento.

Como Aplicar

Recomendações

- Aplicação sobre plantas saudáveis, livres de doenças e pragas, sem stress hídrico ou desequilíbrios fisiológicos e com as folhas verdes.
- Aplicar o SUPER STOP BROTO®18 preferencialmente após uma boa rega ou ocorrência de chuva.
- As plantas não devem estar molhadas com orvalho, água de chuva ou rega.
- A melhor absorção ocorre em condições de humidade relativa elevada e temperatura inferior a 26°C. Em dias muito quentes efectuar a aplicação de manhã, antes que a humidade relativa diminua ou ao fim da tarde.
- Para evitar a lavagem do produto, deve decorrer um período mínimo de 24 horas após a aplicação sem ocorrência de chuva ou rega.
- Não misturar com outros produtos fitofarmacêuticos ou fertilizantes. A aplicação de fungicidas só deve ocorrer 2 dias após a aplicação do SUPER STOP BROTO®18

Fabricado por:

Drexel
Drexel Chemical Company
Memphis, Tennessee
ESTADOS UNIDOS

Titular da Autorização:

PAMENA S. L.
Camino Nuevo 112 - 28109 Alcobendas (Madrid)
609 209 039 / 600 528 552
jugi@pamena.com | www.pamena.com

Distribuído por:

AGROTOTAL
PRODUTOS AGROQUÍMICOS, S.A.
Rua dos Navegantes, 48 r/c, Esq.
1200-732 LISBOA - Tel.: 213 929 980
E-mail: mail@agrototal.pt | www.agrototal.pt