

TERMIBROT®

FICHA TÉCNICA

Regulador de crescimento das plantas e inibidor do abrolhamento em alho, batateira e cebola.

USO NÃO PROFISSIONAL – Linha jardins e hortas familiares

Formulação e composição

Solução concentrada (SL) com 180 g/L ou 15,79% de hidrazida maleica (sob a forma de sal de potássio).

Caraterísticas físicas e químicas

Estado físico:	Líquido
Forma:	Líquido
Cor:	Amarelo
Odor:	Inodoro
pH:	8,0 a 10,0
Densidade relativa:	1,045
Propriedades explosivas:	Não explosivo
Propriedades oxidativas:	Não oxidante

Caraterísticas/ Modo de ação

- Regulador de crescimento das plantas - inibição do abrolhamento, por inibição da mitose (processo de divisão celular) na região meristemática.
- Produto sistémico para aplicação sobre as culturas no campo.
- Absorção total em 24 horas. Período de translocação até aos tubérculos: 15 dias.

Finalidades/ Condições de aplicações

Cultura	Efeito	Dose (mL/100m ²)	Número de aplicações	Época de aplicação	IS (dias)
Alho	Inibidor de abrolhamento	133	1	Aplicar na fase de plena maturação do bolbo, entre BBCH 47 e 48, desde a fase de 10% de plantas com o caule emergido, até 10-15 dias antes da colheita.	15
Batateira	Inibidor de abrolhamento	167	1	Aplicar quando o diâmetro do tubérculo for superior a 2,5 cm, normalmente 4-6 semanas antes da colheita (entre BBCH 43 e 47).	21
Cebola	Inibidor de abrolhamento	120	1	Aplicar entre BBCH 47 e 48, com 50% das plantas com o caule emergido, aproximadamente 15 dias antes da colheita	15

Volume de calda a utilizar: 5 a 6 L/100m²

Condições de utilização e restrições respeitantes a todas as finalidades

Aplicar por pulverização de forma manual com lança/pistola ou pulverizador de dorso. Utilizar volume de calda suficiente para molhar bem as plantas, sem as encharcar. As plantas devem ter as folhas verdes e turgentes, estar saudáveis e não estar sujeitas a stress ou desequilíbrios fisiológicos.

Evitar o contacto com orvalho, água da chuva ou água de aspersão. Em dias muito quentes, fazer a aplicação de manhã, assim que o orvalho tiver desaparecido, antes da humidade relativa descer, e sempre com temperatura inferior a 26°C, ou a partir do fim da tarde e durante a noite antes da ocorrência do orvalho. Não aplicar se houver um prognóstico de chuva ou em ambientes quentes e secos. Observar um período de espera de 24 horas entre a aplicação e a eventual utilização de aspersores ou outros sistemas de rega semelhantes.

A aplicação de **TERMIBROT®** é realizada por pulverização sobre a planta durante o seu desenvolvimento vegetativo. De forma a otimizar a absorção do produto, deve produzir-se uma pulverização de gota fina e uniforme que cubra toda a superfície foliar. A eficácia do tratamento depende das condições vegetativas e ambientais.

Para uma melhor absorção e movimento sistémico, o **TERMIBROT®** deve ser aplicado 1 a 3 dias depois de uma rega ou chuva.

O **TERMIBROT®** demora aproximadamente duas semanas a ser translocado pela planta. Portanto, terá de decorrer pelo menos este período de duas semanas entre a aplicação do **TERMIBROT®** e um eventual tratamento com um produto dessecante ou semelhante.

Nas hortas familiares, não tratar com **TERMIBROT®** mais de 500 m² em cada aplicação.

Precauções biológicas

Não aplicar com temperaturas superiores a 26 °C.

Batateira:

- Não aplicar em batata temporã nem em produção para semente ou propagação.
- Não utilizar as culturas tratadas para alimentar o gado.

Precauções toxicológicas, ecotoxicológicas e ambientais

Advertências de Perigo

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P103: Ler o rótulo antes da utilização.

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P262: Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente.

Informações suplementares

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

EUH401: Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Frases-Tipo suplementares

SP1: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Spe3: Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não-pulverizada de 5 m em relação às águas de superfície.

Spe8: Perigoso para abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração. Remover as infestantes antes da floração.

SPgPT1: Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telefone: 800 250 250.

SPgPT4: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

SPoPT5: Impedir o acesso de pessoas e animais domésticos às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPPT1: A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Outras informações sobre o produto

Autorização de venda n.º 2359

Embalagem: 500 mL

Classificação ADR: Sem classificação de transporte.

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO
RÓTULO DA EMBALAGEM**