

# SUPER STOP BROT®18

ANTI-ABROLHANTE PARA BATATA

Para aplicação por pulverização,  
sobre a cultura instalada no campo

Evita o abrolhamento da batata armazenada  
com uma só aplicação no campo



Batata sem  
tratamento



Batata tratada com  
SUPER STOP BROT 18

- Inibe o abrolhamento da batata armazenada
- Evita o abrolhamento das batatas que ficam no campo
- Calibres mais uniformes
- Melhor qualidade e produtividade
- Facilita a gestão do armazenamento e comercialização



**AGROTOTAL**  
PRODUTOS AGROQUÍMICOS, S.A.

# SUPER STOP BROT®18

## ANTI-ABROLHANTE PARA BATATA

Solução concentrada (SL) com 18% (p/v) de Hidrazida Maleica

### Quando aplicar

2 a 3 semanas depois da plena floração  
3 a 5 semanas antes da colheita ou aplicação de dessecante  
80% dos tubérculos com calibre igual ou superior a 25mm

### Quantidade a Aplicar

Dose máxima de aplicação: 16,7 L/ha

Número de aplicações: 1 aplicação por campanha

Volume de calda recomendado: 300 a 600 L/ha

Intervalo de Segurança: 21 dias

Concentrações proporcionais aos volumes de calda utilizados.

Volume Calda (L/ha)	SUPER STOP BROT®18 (L/ha)	SUPER STOP BROT®18 (L/16 litros de água)
300	5,6	0,90
400	4,2	0,67
500	3,3	0,53
600	2,8	0,45
700	2,4	0,38
800	2,1	0,34

### Como Aplicar

- Por pulverização, sobre a cultura instalada no campo.
- Volumes de calda adaptados ao desenvolvimento da cultura e à superfície foliar a pulverizar.
- Pulverização uniforme de forma a que o produto fique bem repartido por toda a superfície foliar. As plantas devem ficar bem molhadas, sem haver escorrimento.

### Recomendações

- Aplicação sobre plantas livres de doenças e pragas, sem stress hídrico e com as folhas verdes.
- Aplicar 1 a 3 dias após uma boa rega ou ocorrência de chuva.
- Aplicar quando não houver previsão de chuva nas próximas 24 horas.
- Em dias muito quentes, efectuar a aplicação de manhã, antes que a humidade relativa diminua, ou ao fim da tarde. A melhor absorção ocorre em condições de humidade relativa elevada e temperatura do ar inferior a 26°C.
- Deve decorrer um mínimo de 3 semanas entre a aplicação e a colheita ou a utilização de dessecante.
- Não misturar com outros produtos fitofarmacêutico ou fertilizantes.
- Não aplicar em cultura de batata de semente, nem em batata primor (precoce)

SUPER STOP BROT®18 autorizado como inibidor do abrolhamento em batata, cebola e alho.

Fabricado por:



Titular da Autorização:



Distribuído por:



Tel.: 213 929 980

E-mail: mail@agrototal.pt | www.agrototal.pt