

SUPER STOP BROT® 18

Regulador de crescimento para o controlo do espigamento em cebola

O SUPER STOP BROT® 18 é um produto com ação sistémica, à base de Hidrazida Maleica, para aplicação por pulverização sobre as plantas, durante o seu desenvolvimento vegetativo.

O produto é absorvido pelas folhas, nas 24 horas após a aplicação, sendo translocado até aos bulbos. A Hidrazida Maleica inibe a divisão das células na região meristemática, afeta negativamente a diferenciação e o desenvolvimento dos grelos da cebola, não permitindo que cresçam, quer no campo quer no armazém.



Para aplicação por pulverização, sobre a cultura instalada no campo

Evita o espigamento da cebola armazenada com uma só aplicação no campo



Cebola sem tratamento



Cebola tratada com SUPER STOP BROT® 18


- Inibe o espigamento da cebola armazenada.
- Evita o espigamento no campo.
- Melhor qualidade e produtividade.
- Facilita a gestão do armazenamento e comercialização.
- Fácil aplicação no campo, por pulverização.

Época de Aplicação

A fase de desenvolvimento da planta no momento da aplicação do **SUPER STOP BROTT[®]18** é determinante para se obter a máxima eficácia.

Para que ocorra a completa absorção e translocação do produto desde a parte aérea até aos bolbos, a aplicação deve ser efetuada quando os bolbos já estão formados e a parte aérea ainda está verde, saudável e livre de pragas e doenças.

- Em plena maturação dos bolbos.
- Cerca de 50% das plantas com o caule / folhas tombadas.
- Cerca de 15 dias antes da colheita.



Dose de Aplicação

Dose de aplicação:	10,0 a 12,5 L/ha
Número de aplicações:	1 aplicação por campanha
Volume de calda*:	500 a 600 L/ha
Intervalo de Segurança:	15 dias



* Volumes de calda adaptados à massa foliar e às condições atmosféricas existentes. Os volumes mais altos são para utilizar em vegetação mais densa, ou humidade relativa mais baixa ou temperaturas mais elevadas.

Como Aplicar

Pulverização uniforme, com gota fina, de forma a que o produto fique bem repartido por toda a superfície foliar. As plantas devem ficar bem molhadas, sem haver escorrimento. Adaptar os volumes de calda ao desenvolvimento da cultura e à superfície foliar a pulverizar.

Aplicação com pulverizador de barras

Aplicar a dose recomendada, utilizando bicos cónicos e uma pressão de trabalho de 4 a 5 kg/cm²

Aplicação com pulverizador de dorso

Concentrações proporcionais aos volumes de calda utilizados. Para um volume de 500 L/ha, a concentração máxima é de 2,5 L/hl, para um volume de 600 L/ha a concentração baixa para os 2,08 L/hl.

Recomendações

- Aplicação sobre plantas saudáveis, livres de doenças e pragas, sem stress hídrico ou desequilíbrios fisiológica e com as folhas verdes.
- Aplicar o **SUPER STOP BROTT[®]18** preferencialmente após uma boa rega ou ocorrência de chuva.
- As plantas não devem estar molhadas com orvalho, água de chuva ou de rega.
- A melhor absorção ocorre em condições de humidade relativa elevada e temperatura do ar inferior a 26°C. Em dias muito quentes efetuar a aplicação de manhã, antes que a humidade relativa diminua ou ao fim da tarde.
- Para evitar a lavagem do produto, deve decorrer um período mínimo de 24 horas após a aplicação sem ocorrência de chuva ou rega.
- Não misturar com outros produtos fitofarmacêuticos ou fertilizantes. A aplicação de fungicida só deve ocorrer 2 dias após a aplicação do **SUPER STOP BROTT[®]18**.

Fabricado por:



Drexel Chemical Company
Memphis, Tennessee
ESTADOS UNIDOS

Titular da Autorização:



Avenida de las Encinas N.º 11 (CIUDALCAMPO)
28707 San Sebastián de los Reyes (MADRID)
(+34) 609 209 039 | (+34) 600 528 552
jugi@agropamena.com | www.agropamena.com

Distribuído por:



Rua Leopoldo de Almeida, nº4-A
1750-138 Lisboa - Tel.: 213 929 980
E-mail: mail@agrototal.pt | www.agrototal.pt